

Migrant Health Promotion



HIV Jeopardy Game

This is a short piece that can be played as a game with groups or used as a part of a theater performance.

Characters:

Game Show Host
Audience members

Divide audience into two teams. If audience is too large, select two small groups to participate in the game.

The game works by having the first team select a category and the point value of a question. The host then reads the question to that team. All of the team members may confer on the answer and then give an answer. If they are correct, they get the point value of the question they selected. If they are incorrect, that question goes back on the board for the other team to answer. There are two categories, each with five questions.

English **HIV**

100 Question: True or false. A person can get HIV the first time they have sex.

Answer: True. Anyone who has sex without a condom is at risk for HIV, no matter how many times they have had sex.

200 Question: If a person is infected with HIV, how long will they be infected with HIV?

Answer: The rest of their lives. There is no cure for HIV. Even if a person has AIDS, they are still infected with HIV and can pass it to others.

300 Question: Pick the two ways a person can NOT get infected with HIV.

- a. Having sex without a condom
- b. Drinking out of the same glass as someone who has AIDS
- c. Sitting on a public toilet seat or sharing a bathroom with someone infected with HIV
- d. Sharing infected needles to inject drugs

Answer: b and c.

A person can not be infected with HIV by drinking out of the same glass as someone who has AIDS or by sitting on a public toilet seat or sharing a bathroom with someone infected with HIV

- 400 Question: Why are condoms not 100% effective at preventing HIV?
- a. They are not always used correctly
 - b. They break easily
 - c. Condoms just don't prevent HIV

Answer: a. Sometimes, people use old condoms or damaged condoms. They may use oil-based lubricants like Vaseline or vegetable oil or lotion, which break condoms. They put the condom on inside out. They do not leave a tip in the condom. They don't take the condom off in time. All of these are ways that condoms are not used correctly.

- 500 Question: Name the four body fluids that HIV can live in.

Answer: Blood, semen, vaginal fluids, and breast milk.

HIV and Substance Abuse

- 100 Question: True or false. Using alcohol or other drugs puts a person at risk for getting infected with HIV.

Answer: True. Using alcohol or other drugs impairs a person's judgment. This means that a person might have sex, even though they would not if they were sober. They may forget to use a condom, or not use a condom correctly, or they may trade sex for drugs or money.

- 200 Question: Name one of the most effective ways that people can avoid getting infected with HIV.

Answer: Not having sex (abstinence) OR not sharing needles for injecting drugs, getting a tattoo or piercing, etc.

- 300 Question: Name another very effective way that people can avoid getting infected with HIV.

Answer: Not having sex (abstinence) OR not sharing needles for injecting drugs, getting a tattoo or piercing, etc.

- 400 Question: Name two ways alcohol and other drugs affect a person's judgement?

Answer: Any of the following: 1) They might have sex when they would not have sex if they were sober, 2) They might not use a condom, 3) They might decide to get a tattoo or a piercing that they would not get if they were sober or

they might go to a place that is not safe to get a tattoo or piercing, 4) They might share needles to inject drugs, 5) They might trade sex for drugs or money

- 500 Question: Name three ways a person who uses drugs or alcohol increases their risk of being infected with HIV?

Answer: (any three of these) 1) A person could forget to use a condom, 2) they could use a condom wrong because they were drunk or high, 3) they could share needles to inject drugs or vitamins, 4) they could have sex when they did not intend to have sex, or 5) they could trade sex for drugs.

Español

El VIH

- 100 Pregunta: cierto o falso. Una persona se puede infectar con el VIH la primera vez que tenga sexo.

Respuesta: Ciento. Cualquier persona que tenga sexo sin un condón se pone al riesgo de infectarse con el VIH, no importa cuántas veces que hayan tenido sexo.

- 200 Pregunta: Si una persona está infectada con el VIH, ¿Cuánto tiempo se quedará infectado/a?

Respuesta: Se quedará infectado/a por el resto de su vida. No existe ninguna manera para curarse del VIH. Aún si una persona tiene el SIDA, aún está infectado/a con el VIH y se lo puede pasar a otras personas.

- 300 Pregunta: Elige las dos maneras por las que uno NO se puede infectar con el VIH.

- a. Tener sexo sin usar un condón.
- b. Usar el mismo vaso que ha usado alguien que está infectado/a con el SIDA.
- c. Usar un lavabo público o compartir un cuarto de baño con alguien que está infectado/a con el SIDA.
- d. Compartir jeringas infectadas para inyectarse con drogas.

Respuesta: b y c.

- b. Usar el mismo vaso que ha usado alguien que está infectado/a con el SIDA.
- c. Usar un lavabo público o compartir un cuarto de baño con alguien que está infectado/a con el SIDA.

- 400 Pregunta: ¿Porqué los condones no son 100% eficaz para prevenir el VIH?

- a. No siempre se los usa correctamente.
- b. Los condones se rompen facilmente.
- c. Los condones no funcionan para prevenir el VIH.

Respuesta: A veces, la gente usa condones viejos o dañados. También a veces se usa lubricantes con base de aceite, como Vaseline, aceite para cocinar, o crema para el cuerpo, que rompen los condones. La gente pone el condón de manera incorrecta, por ejemplo con la parte interior por fuera, o no deja un espacio vacío al extremo del condón. A lo mejor no se lo quita el condón antes de que se pierda la erección. Todas éstas son maneras en las que no se usa los condones correctamente.

- 500 Pregunta: Dí los 4 fluídos del cuerpo en los que puede vivir el VIH.

Respuesta: Sangre, semen, fluido vaginal, y leche materna

el VIH y el abuso de drogas y alcohol

- 100 Pregunta: Ciento o Falso. El usar alcohol u otras drogas se pone una persona al riesgo para infectarse con el VIH.

Respuesta: Ciento. El usar alcohol u otras drogas empeora la capacidad de tomar decisiones. Esto significa que una persona tendrá relaciones sexuales, aunque no lo haría si fuera sobrio. Se puede olvidar de usar un condón, no usarlo correctamente, o intercambiar el sexo para drogas o dinero.

- 200 Pregunta: Dí una de las maneras más efectivas con la que la gente puede evitar infectarse con el VIH.

Respuesta: No tener relaciones sexuales (la abstinencia), o no compartir jeringas/agujas para inyectarse con drogas, ponerse un tatuaje, perforarse la oreja, etc.

- 300 Pregunta: Dí otra manera muy efectiva para prevenir que se infectan con el VIH.

Respuesta: No tener relaciones sexuales (la abstinencia), o no compartir jeringas/agujas para inyectarse con drogas, ponerse un tatuaje, perforarse la oreja, etc.

- 400 Pregunta: Dí dos formas en las que el alcohol y las otras drogas afectan los poderes de juicio de una persona.

Respuesta: Cualquier dos de los siguientes: 1) Se puede tener relaciones sexuales en una situación en la cual normalmente no las tendría si fuera sobrio 2) Se puede olvidarse de usar un condón 3) Se puede tomar decisiones, como ponerse un tatuaje o perforarse la oreja, que no tomaría si fuera sobrio, o irse a un sitio para hacerlo que no sea muy seguro 4) se puede compartir jeringas para inyectarse con drogas 5) se puede intercambiar sexo para drogas o dinero

500 Pregunta: Dí tres maneras en las que una persona que usa drogas o alcohol aumenta su riesgo de infectarse con el VIH.

Respuesta: (cualquier tres de estas cosas) 1) Se puede olvidar de usar un condón
2) se puede usar un condón de manera equivocada porque estaba tomado o afectado por drogas 3) se puede usar jeringas para inyectarse con drogas o vitaminas 4) se puede tener relaciones sexuales cuando no estaban pensando tenerlas 5) se puede intercambiar el sexo por drogas